

**Frühjahr 12 Themennummer 1 Aufgabe 2 im Bayerischen Staatsexamen  
Analysis (vertieftes Lehramt)**

Fragen zur Funktionentheorie:

- a) Gibt es eine holomorphe Funktion  $f : \{z \in \mathbb{C} : |z| < 2\} \rightarrow \mathbb{C}$ , sodass  $f(\frac{1}{2}) = 2$  ist und  $|f(z)| = 1$  für alle  $z \in \mathbb{C}$  mit  $|z| = 1$  ist.
- b) Gibt es eine holomorphe Funktion  $g : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ , so dass für alle  $x + iy \in \mathbb{C}$  gilt:  
(Im  $g$ )( $x + iy$ ) =  $x^2 - y^2$ ?
- c) Gibt es eine offene Umgebung  $U \subseteq \mathbb{C}$  von 0 und eine holomorphe Funktion  $h : U \rightarrow \mathbb{C}$ , so dass für alle  $n \in \mathbb{N}_0$  gilt:  $h^{(n)}(0) = (-1)^n(2n)!$

**Lösungsvorschlag:**

- a) Nein, die gibt es nach dem Maximumsprinzip nicht. Ist  $f$  holomorph auf  $\{z \in \mathbb{C} : |z| < 2\}$ , so auch auf  $\{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$ . Nach dem Maximumsprinzip nimmt  $f$  das Betragsmaximum auf  $\overline{\{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}}$  am Rand an, es beträgt nach den Voraussetzungen also 1. Wegen  $|\frac{1}{2}| < 1$  muss also  $|f(\frac{1}{2})| \leq 1$  gelten, im Widerspruch zu  $|2| = 2 > 1$ .
- b) Ja gibt es, zum Beispiel ist  $g(z) = iz^2$  ganz und es ist  $g(x + iy) = -2xy + i(x^2 - y^2)$ , weshalb der Imaginärteil die geforderte Form hat.
- c) Nein, die gibt es nicht. Nach dem Satz von Taylor würde sich  $f$  um 0 in eine lokal konvergente Potenzreihe entwickeln lassen, deren Koeffizienten durch  $\frac{f^{(n)}(0)}{n!}$  gegeben sind, hier also  $(-1)^n \frac{(2n)!}{n!}$ . Mit der Formel von Euler erhalten wir als Konvergenzradius also

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_n|}{|a_{n+1}|} = \frac{(2n)!}{(2n+2)!} \frac{(n+1)!}{n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{(2n+1)(2n+2)} = 0,$$

ein Widerspruch zur lokalen Konvergenz der Potenzreihe um 0.

*J.F.B.*