

**Herbst 23 Themennummer 3 Aufgabe 3 im Bayerischen Staatsexamen
Analysis (vertieftes Lehramt)**

a) Es sei

$$f : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad f(t, x) = t \log(1 + x^2) + t^2 \cos(x).$$

Zeigen Sie: Jede maximale Lösung von $x' = f(t, x)$ hat \mathbb{R} als Definitionsbereich.

b) Bestimmen Sie alle $r \geq -2023$, so dass folgende Aussage gilt: Jede beschränkte holomorphe Funktion $f : \{z \in \mathbb{C} : |z - i| > r\} \longrightarrow \mathbb{C}$ ist konstant. Begründen Sie Ihre Antwort.

Lösungsvorschlag:

a) Wir beobachten zuerst, dass

$$(\log(1 + x^2))' = \frac{2x}{1+x^2}$$

für alle $x \in \mathbb{R}$. Es ist $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x}{1+x^2} = 0$, da der Nennergrad höher als der Zählergrad ist. Damit muss $\mathbb{R} \ni x \mapsto \frac{2x}{1+x^2}$ beschränkt sein, denn man kann wegen der Grenzwerteigenschaften ein $R > 0$ wählen, sodass $|\frac{2x}{1+x^2}| \leq 1$ für alle $\mathbb{R} \setminus [-R, R]$ gilt. Auf $[-R, R]$ ist die Funktion, da sie stetig ist, aufgrund des Satzes von Weierstraß beschränkt. Es sei L diese obere Schranke von $\mathbb{R} \ni x \mapsto \frac{2x}{1+x^2}$. Dann gilt für $(t, x) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} |t \log(1 + x^2) + t^2 \cos(x)| &= \left| t \int_0^x \frac{2s}{1+s^2} ds + t^2 \cos(x) \right| \\ &\leq |t| \left| \int_0^x L ds \right| + t^2 |\cos(x)| \\ &\leq |t|L|x| + t^2 \end{aligned}$$

Die Strukturfunktion ist also linear beschränkt. Sie ist offensichtlich stetig und lokal Lipschitz stetig (, da sie C^1 ist). Aus den bekannten Resultaten der Differentialgleichungstheorie folgt nun das gewünschte Resultat.

b) Für $r \in [-2023, 0)$ ist f auf ganz \mathbb{C} definiert. Dann greift der Satz von Liouville, dass Beschränktheit von f impliziert, dass f konstant ist.

Ist $r = 0$, so wird der Definitionsbereich von f zu $\mathbb{C} \setminus \{i\}$. Wir nehmen weiter an, dass f beschränkt ist. Dann kann man f nach dem Riemannschem Hebbarkeitssatz zu einer ganzen Funktion $\tilde{f} : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ fortsetzen. Diese ist beschränkt, da $\tilde{f}(\mathbb{C}) = f(\mathbb{C}) \cup \{f(i)\}$ und $f(\mathbb{C})$ nach Annahme beschränkt ist. Damit ist \tilde{f} nach dem Satz von Liouville konstant. Damit ist auch f konstant.

Ist $r > 0$, so können wir etwa die holomorphe Funktion $f(z) := \frac{1}{z-i}$ für alle $z \in \{z \in \mathbb{C} : |z - i| > r\}$ betrachten. Dann ist für solche z :

$$|f(z)| = \left| \frac{1}{z-i} \right| \leq \frac{1}{r}$$

Damit ist f beschränkt. f ist aber offenbar nicht konstant.

Die gesuchten r sind also alle $r \in [-2023, 0]$.

(JR)